



Sterilisatie van de poes

Op een leeftijd van ongeveer 6 maanden wordt uw poes volwassen. De krolsheid van de poes is hiervan een eerste teken. De poes is dan zeer aanhalig, rolt over de grond en is tijdelijk gewillig voor een kater. Gedurende een periode van ongeveer 3 weken kan de poes gedekt en dus ook drachtig worden.

Wanneer u dit als eigenaar liever niet ziet gebeuren, is het van belang dat er tijdens de krolsheid geen niet gecastreerde katers in de buurt van de poes komen. Na de krolsheid is het mogelijk om uw poes te laten steriliseren.

Tijdens een sterilisatie worden, om de poes onvruchtbaar te maken, beide eierstokken (*ovaria*) en in sommige gevallen ook beide baarmoederhoorns (*uteri*) verwijderd. Hierdoor wordt de hormoonproductie verwijderd en zal de kat niet meer krols of drachtig worden.

Op de operatie dag

In de ochtend, tussen 08:30 h en 09:00 h wordt de poes door een assistente van de kliniek opgenomen in de opnameruimte. De poes moet voor de narcose nuchter zijn, dit houdt in dat zij vanaf 22:00 h de dag van te voren niet meer mag eten, water drinken mag wel. De maag is dan op het moment van de operatie nuchter waardoor er niet kan worden gebrakt. Zo kan er geen braaksel in de luchtwegen terecht komen.



Vooronderzoek en narcose

Wanneer de poes is gewogen, wordt zij klinisch nagekeken. Het hart, de slijmvliezen en de pols worden gecontroleerd en pas daarna wordt de narcose toegediend. Na ongeveer 5 minuten is de poes in een diepe slaap, is zij zich nergens meer van bewust en zal niets van de operatie voelen.

Hierna wordt de poes voorbereid voor de operatie. De buik wordt geschoren en ontsmet. Pijnstilling en antibiotica worden toegediend en de poes krijgt tijdens de narcose een tube in de luchtpijp waarmee zij wordt aangesloten op het narcose apparaat.



Belangrijk: Geef uw kat op de dag vóór de operatie vanaf 22:00 geen eten meer!

De operatie

De sterilisatie van de kat is een zeer veel voorkomende en uitgevoerde chirurgische ingreep in de veterinaire praktijk. Tijdens de operatie wordt een snede gemaakt in de buik. De huid, onderhuid en buikspieren worden doorsneden, waarna de buikholte zichtbaar wordt. De baarmoederhoorns en eierstokken worden opgevist, waarna de eierstokken worden verwijderd.

Wanneer sprake is van ontstoken of afwijkende baarmoederhoorns worden ook deze direct verwijderd. Na controle van de buikholte wordt deze met oplosbaar hechtmateriaal gesloten. Dit gebeurt met een doorlopende hechting en omdat de laatste laag onderhuids wordt gehecht is in de meeste gevallen slechts 1 hechting zichtbaar. Na de operatie wordt de wond behandeld met *lasertherapie*. Hierdoor zal de wondgenezing sneller en minder pijnlijk verlopen.



Nazorg en herstel

Na de operatie wordt de poes teruggebracht naar haar kooi in de recoveryruimte/opname. Om er voor te zorgen dat de ze geen kou lijdt, liggen er in alle kooien warmtematten waarop de poes haar roes kan uitslapen.

Na ongeveer 1-2 uur is de poes weer bij kennis en start zij vaak al met het schoonmaken van de operatiewond. Om te voorkomen dat zij hierbij de wond open likt, zal de poes een kraagje of medical petshirt (romper) krijgen, waardoor ze niet bij de wond kan. De wond zal binnen 7-10 dagen geheel genezen zijn. Na 10 dagen mag de poes, indien nodig, voor controle komen en zal de hechting worden verwijderd. De inwendige hechtingen zullen zelf oplossen.

Na de ingreep wordt u door de verantwoordelijk assistente op de hoogte gebracht van het verloop van de operatie. Zij spreekt dan met u een tijdstip af waarop uw kat kan worden opgehaald. Wij stellen het op prijs wanneer u zich op tijd meldt bij de balie. Tijdens dat moment krijgt u alle uitleg, medicatie en tips van de assistente zodat u goed geïnformeerd de kliniek verlaat.

U krijgt bij het ophalen van de poes pijnstillende tabletten en antibiotica mee. volg de instructies van de assistente goed op en maak een antibiotica kuur altijd af.



Handig: als u het wilt kan de poes tijdens de narcose voor €25,00 gelijk gechipt worden!

Thuis

Geef uw kat een rustige plek en laat haar zoveel mogelijk met rust. Eten is op de operatie dag niet noodzakelijk. Wanneer de kat laat blijken dat zij trek heeft, mag vanaf het door de assistente aangegeven tijdstip wat nat voer en water aanbieden.

Kosten

De kosten van een sterilisatie staan vermeld op onze website www.dierenkliniekwarteze.nl. De vermelde prijs is inclusief medicatie, kraag, nazorg en eventuele controle* na 7-10 dagen. De prijs is exclusief een eventueel medical petshirt (romper).

*vaak wordt de slothechting door de arts tijdens het hechten 'weggewerkt'. U hoeft dan niet terug te komen bij de assistente voor een controle. Al het hecht draad wat zich onderhuids bevindt, wordt door het lichaam opgelost.

Veel gestelde vragen

Vraag: **'vanaf welke leeftijd mag mijn poes gesteriliseerd worden?'**

Antwoord: wettelijk mag dit al vanaf 12 weken. Onze kliniek geeft echter de voorkeur aan een oudere leeftijd, namelijk vanaf 6 maanden en het liefst na de eerste krolsheid.

Vraag: **'is het erg als de poes pas op latere leeftijd gesteriliseerd wordt?'**

Antwoord: dat is geen probleem, maar er is dan wel meer kans dat de poes zwanger wordt.

Vraag: **'kan ik mijn poes niet gewoon de poezepil geven?'**

Antwoord: dat is zeker mogelijk, maar kent wel risico's. De poezenpil is een hormoonpreparaat en kan op latere leeftijd melkkliertumoren veroorzaken bij de poes. Deze aandoening is in veel gevallen niet te behandelen of kan blijven terugkeren.

Vraag: **'wat is beter na een operatie; een kraag of een medical petshirt (romper)?'**

Antwoord: een kraag is voor veel dieren een lastig obstakel waarmee zij overal tegen aanbotsen. Wel is het qua aanschaf goedkoper. Voor de meeste patiënten is een medical petshirt een stuk diervriendelijker. Echter kunnen sommige katten (ook) niet omgaan met een medical petshirt. Dan resteert de eigenaar niets anders dan het shirt uit te trekken en de kat beter in de gaten te houden.

Vraag: **'mag de kat echt niet aan de wond likken?'**

Antwoord: in principe willen wij dit voorkomen. Katten zijn echter natuurlijke acrobaten en verzinnen soms van alles om toch aan de wond te kunnen komen. Omdat de meeste hechtingen onderhuids zijn aangebracht, kan het meestal niet veel kwaad. Gaat de kat geobsedeerd likken aan de wond, dan is het toch verstandig om de kraag of het shirt enkele dagen om te houden.



Heeft u andere vragen? Bel of mail ons dan gerust!

Bij spoed:

Mocht u twifelen aan het herstel van uw huisdier na de operatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij zijn tijdens werktijden bereikbaar via telefoonnummer **010 599 049 0**, buiten werktijden kiest u in het keuzemenu voor optie 1 (**spoed**). U wordt dan doorverbonden met de dierenarts van dienst. De spoedlijn is dagelijks tussen **08:30 h** en **23:00 h** bereikbaar. Buiten deze tijden wordt u doorverwezen.



Dierenkliniek Zwarte Zee
Zwarte Zee 30 3144 DE



010 599 049 0



Info@dierenkliniekwartezee.nl



www.dierenkliniekwartezee.nl



/Dierenkliniekwartezee

Openingstijden:

Balie

Ma, Di, Wo, Do, Vr : 09:00 – 19:00

Open spreekuur

Zaterdag : 09:30 – 12:00

Telefonisch spreekuur *

Ma, Di, Do, Vr : 16:30 – 17:00

**U wordt gebeld*

Voor alle informatie en meer: download de MijnDierenartsApp

